Sound-alike/Look-alike

Version du 20 mars 2015

CoRéMéDiMS-OMEDIT-MiP
Comité Régional du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles de Midi-Pyrénées

Préviscan® (fluindione)

Problématique(1)

• Le Préviscan® (fluindione) est un anticoagulant oral. Ce médicament à **marge thérapeutique étroite** a fait l'objet de **plusieurs confusions avec d'autres médicaments**, pouvant avoir de **graves conséquences**.
• Les erreurs de prise en charge des patients sous anticoagulants font partie des **12 événements qui ne devraient jamais arriver**. (Voir *fiche info NE 01. Patients sous anticoagulants*)

5 hospitalisations pour **troubles hémorragiques** à la suite de **confusion Preservision®/Previscan®** (2)

LOOK-ALIKE P ! B SOUND-ALIKE ©2008

Quelques exemples de confusion

SOUND ALIKE

• **Préviscan®/Préservision®** (complément alimentaire à visée oculaire) : possible confusion à la lecture de l'ordonnance

Exemple : patiente de 86 ans, traitée par acenocoumarol (AVK) depuis 8 ans et Preservision®. Erreur de lecture d'une ordonnance bien écrite → Délivrance de 3 cp/j de Préviscan® au lieu de Preservision® → la patiente a pris 2 AVK simultanément pendant 9 j → Hospitalisation pour hémorragie (INR > 15) : transfusée et 17j d' hospitalisation.

SOUND ALIKE

• **Préviscan®/Permixon®** (*Serenoa repens*) : possible confusion à la lecture de l'ordonnance

Exemple : Patient de 68 ans hospitalisé pour hématomes et hématurie macroscopique à la suite d'une confusion Previscan®/Permixon® au moment de la délivrance du médicament. Retour à la normale 48h après l'injection de vitamine K.

LOOK ALIKE

• **Préviscan®/Lisinopril EG®** : grande ressemblance des comprimés

Exemple de signalement traité par le Guichet Erreurs Médicamenteuses : patiente de 76 ans qui a pris un 1/2 cp de Lisinopril EG 20 mg à la place d'1/2 cp de Previscan 20 mg

Préviscan®

Lisinopril EG®

Comment éviter les erreurs ?

Préviscan®/Lisinopril EG®
• **Ne référencer qu'1 des 2 spécialités** dans le même établissement
• Informer le patient de la ressemblance des 2 médicaments
• Laisser chacun des médicaments dans son **blister jusqu'au dernier moment**

Préviscan®/Preservision® ou **Préviscan®/Permixon®**
• **Attention à la posologie** : la posologie usuelle est différente pour ces médicaments
  • Previscan® : aux alentours d'1 cp x1/j (à adapter à l'INR)
  • Preservision® : 2 à 3 cp/j
  • Permixon® : 1 gélule x2/j
• **Préciser le dosage** du comprimé : Préviscan® **20** mg, Preservision®, Permixon® **160** mg

Partagez vos expériences !
coremedims.mip.assistant@orange.fr

(1) Communiqué ANSM 2010 - Risque de confusion entre comprimés de Préviscan® 20 mg et lisinopril EG 20 mg
(2) Afssaps 2010 - Confusion entre Previscan® et Preservision® à l'origine de manifestations hémorragiques graves