

# XAGRID®

Anagrélide

## CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible dans les pharmacies de ville.

## PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible :

- Flacon de 100 gélules blanches dosées à 0,5 mg avec fermeture de sécurité.

Conservez ce médicament à **température ambiante**, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, et hors de portée des enfants.

## POSOLOGIE

La posologie initiale d'anagrélide recommandée est de 1 mg/jour, à administrer par voie orale en deux prises séparées (0,5 mg/prise). Cette posologie initiale doit être maintenue pendant au moins une semaine.

Votre posologie pourra être adaptée par la suite par votre médecin selon vos résultats.

La dose maximale recommandée ne doit pas excéder 2,5 mg/prise et 10mg/jour.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**  
**Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.**

## PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Maux de tête, sensation vertigineuses, fatigue	Reposez vous souvent.	La prudence est recommandée pour les utilisateurs de véhicules ou de machines.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.

Diarrhée	Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Évitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Œdème des membres	Élevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Évitez les vêtements serrés.	Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la [notice du médicament](#)

### CONSEILS AUX PATIENTS



Les gélules doivent être prises avec un grand verre d'eau pendant ou en dehors des repas.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Ne pas ouvrir les gélules.



Ne pas jeter les emballages ni les gélules dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



**Si vous avez oublié de prendre vos gélules de Xagrid®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.**



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- difficulté à respirer ou toux anormale.
- saignements de nez, saignements anormaux (selles noires, sang dans les crachats).
- palpitations, tachycardie.