

BOSULIF®

Bosutinib

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit à l'hôpital par un médecin spécialiste en **hématologie, oncologie médicale** ou **cancérologie**. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Deux dosages sont disponibles, boîte de 28 comprimés sous plaquettes de 14 comprimés pelliculés : 100 mg (comprimés pelliculés jaunes) et 500 mg (comprimés pelliculés rouges).

Conserver à température ambiante

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle et vous sera expliquée par votre médecin. La dose habituelle est de **500 mg, une fois par jour, au moment des repas**.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou survenue d'une toxicité inacceptable.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.

Ne prenez aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Hématologiques : baisse des globules blancs, des plaquettes et anémie.	Limitez les contacts avec les personnes malades et désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires.
	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	Soyez attentif aux signes et symptômes évocateurs d'une hémorragie (saignement de nez, ecchymoses : tâches violacées sur le corps). En cas de saignement important, contactez le médecin prescripteur.
Cutanés (++) : éruptions (boutons rouges), démangeaisons, photosensibilisation	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil, protégez vous des rayons du soleil (chapeau, écran total).	Informez le médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager (des crèmes hydratantes par exemple).

Digestifs (+++) : diarrhées (+++), nausées (++), constipation	Prenez le comprimé le soir, en fin de repas, avec de l'eau. Diarrhées : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus et l'alcool. Nausées/vomissements : buvez entre les repas, évitez les aliments gras, frais ou épicés, mangez lentement, faites plusieurs petits repas.	Diarrhées : buvez au moins 2 litres d'eau par jour et privilégiez les féculents. En cas de diarrhées et/ou de nausées prolongées, contactez votre médecin pour un traitement.
Rétention hydrique : œdèmes, prise de poids	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez votre médecin.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament

CONSEILS AUX PATIENTS



- Les comprimés sont à avaler **entiers** (ni brisés, ni mâchés) par voie orale avec un grand verre d'eau **au cours des repas, chaque jour de préférence à la même heure.**



- **Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Bosulif®**, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et notez cet oubli dans le carnet de suivi.



- **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier vous même la dose de BOSULIF® sans avis du médecin prescripteur.**



- Ne pas prendre BOSULIF® en cas de **grossesse et d'allaitement**. Chez toute femme susceptible de procréer, une méthode de contraception efficace doit être mise en place pendant toute la durée du traitement. En cas de grossesse, la patiente doit être informée des risques potentiels pour le fœtus.



- Evitez de manger des **pamplemousses** ou de boire du jus de pamplemousse tout le temps de votre traitement par BOSULIF®.



- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



- Ne laissez pas votre traitement à la portée des enfants.



- Ne jetez pas les emballages, ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien



- Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle. En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), lavez ce linge immédiatement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).

Contactez rapidement le médecin et appelez les urgences en cas de :

- signes de pneumonie : dyspnée, toux, essoufflements ou modification du rythme respiratoire.

- fièvre.

- signes de pancréatite : douleur abdominale aiguë.

