

MYLERAN®

Busulfan

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin hospitalier** et son renouvellement est réservé aux hématologues, oncologues et médecins compétents en cancérologie. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible :
- flacon de 25 comprimés pelliculés blancs dosés à 2 mg.

A conserver à une température ne dépassant pas +25 °C. Conserver hors de portée des enfants.

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle. Elle dépend de la pathologie et de son stade d'évolution.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**
Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diminution des globules blancs	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin. Évitez les contacts avec les personnes malades.	Prenez votre température avant chaque prise. En cas de signes infectieux (fièvre, frissons) ou de symptômes évocateurs d'infections, prévenir le médecin. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Diminution des plaquettes (saignement)	Utilisez une brosse à dent souple. Évitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	En cas de saignements importants, contactez le médecin.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Éviter les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Ulcérations de la bouche.	Évitez les aliments acides, épicés et irritants. Maintenir une bonne hygiène buccale.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez le médecin.

Insomnie, fatigue, vertiges, confusion.	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles.	Prudence en cas de conduite de véhicules.
---	--	---

Une perte de cheveux et une modification de la couleur de la peau surviennent fréquemment.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



Le MYLERAN® se prend avec un **grand verre d'eau**, en une prise par jour, au cours ou en dehors d'un repas.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas broyer les comprimés.



Ne pas prendre le MYLERAN® en cas de grossesse et d'allaitement. Utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et durant les deux semaines suivant son arrêt.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Myleran®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi..



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



Contactez rapidement le médecin en cas

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...).
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang
- difficulté à respirer ou toux anormale.