

LYSODREN®

Mitotane

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Lysodren® doit être prescrit par un **médecin hospitalier spécialiste** en endocrinologie, oncologie, pédiatrie ou en médecine interne (LISTE I). Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible, sous forme de comprimés :

- flacon de 100 comprimés blancs dosés à 500mg.

Conserver ce médicament à température ambiante, hors de portée des enfants, dans son flacon d'origine, au maximum 1 an après ouverture du flacon. Ne pas consommer le médicament après la date de péremption.

POSOLOGIE

La posologie initiale est de 2 comprimés 2 à 3 fois par jour. La posologie peut être adaptée par votre médecin.

Chez l'enfant ou l'adolescent, la posologie est de 1.5-3.5g/m²/jour, répartis en deux ou trois prises quotidiennes.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin. Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.**

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Eruption cutanée	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil. Ecran total.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.

Vertige, sommolence, picotement, fourmillements, confusion.	Faites réaliser les dosages que votre médecin vous prescrit.	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes. Prudence lors de la conduite de véhicule ou d'utilisation de machine.
---	--	--

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



La prise se fait à l'aide d'un grand verre d'eau au cours d'un repas riche en matières grasses (chocolat, lait, huile), deux à trois fois par jour.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire ni doubler la dose suivante. Si vous pensez avoir pris accidentellement plus que la dose prescrite : contactez immédiatement votre médecin.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Lysodren®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Ne pas prendre LYSODREN® en cas de grossesse et d'allaitement. Utilisez une méthode de contraception efficace. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.



Risque possible de somnolence et de vertiges : prudence lors de la conduite de véhicule ou d'utilisation de machines.



Garder la carte Patient Lysodren® sur soi (partie à détacher de la notice).



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- **fatigue, perte d'appétit, perte de poids, douleurs abdominales, nausées, vomissements** (symptômes pouvant révéler une insuffisance surrénale)
- diarrhées
- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...)
- confusion, sensations anormales (fourmillements, picotements), perte de mémoire, vertiges
- jaunisse ou urines foncées, démangeaisons.