

JAKAVI®

Ruxolitinib

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit à l'hôpital par un médecin spécialiste **en hématologie** ou un **médecin compétent en maladie du sang**. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUE

Trois dosages sont disponibles par boîte de 56 comprimés sous plaquettes thermoformées : 5mg, 15mg, et 20mg.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle et vous sera expliquée par votre médecin. La dose initiale recommandée de ruxolitinib varie en fonction de votre taux de plaquettes.

Le traitement peut être poursuivi aussi longtemps que le rapport bénéfice/risque reste positif. En revanche, le traitement doit être arrêté après 6 mois en l'absence de réduction de la taille de la rate ou d'amélioration des symptômes depuis l'instauration du traitement.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**

Ne prenez aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Hématologiques (+++) baisse des globules blancs, baisse des plaquettes et anémie (+++).	Limitez les contacts avec les personnes malades et désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires.
	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	Soyez attentif aux signes et symptômes évocateurs d'une hémorragie (saignement de nez, ecchymoses : tâches violacées sur le corps). En cas de saignement important, contactez le médecin prescripteur.
Etourdissement, céphalées	Reposez vous régulièrement et ayez une activité physique adaptée	Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines
Infections (++) : Zona, tuberculose	Tuberculose : Informez votre médecin en cas d'antécédents médicaux, de contacts antérieurs avec la tuberculose et/ou de tests de dépistage (radiographie pulmonaire, test tuberculinique, test de détection de la production d'interféron gamma).	En cas d'apparition de signes et/ou symptômes de zona : douleur vive à type de brûlures, éruptions cutanées : contactez le médecin. Un traitement doit être envisagé le plus rapidement possible.

Anomalies de la fonction hépatique et lipidique, gain de poids	Faites contrôler votre fonction hépatique et votre taux de cholestérol dans le sang avant d'initier le traitement. Vérifiez la prise de poids : respectez les conseils diététiques et d'hygiène de vie (ne pas manger trop gras, trop sucré, avoir une activité physique régulière et adaptée...)	Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. En cas de prise de poids, contactez votre médecin.
Digestifs : diarrhées, nausées/vomissements, constipation	Prenez le comprimé le soir, en fin de repas, avec de l'eau. Diarrhées : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus et l'alcool. Nausées/vomissements : buvez entre les repas, évitez les aliments gras, fris ou épicés, mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers.	Diarrhées : buvez au moins 2 litres d'eau par jour et privilégiez les féculents. En cas de diarrhées et/ou de nausées prolongées, contactez votre médecin pour un traitement.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament

CONSEILS AUX PATIENTS



Les comprimés sont à avaler **entiers** (ni écrasés, ni mâchés) avec un grand verre d'eau, **chaque jour environ à la même heure, au cours ou en dehors des repas.**



En cas d'oubli d'une prise, ne prenez pas **une nouvelle dose, mais attendez la prochaine dose selon la prescription habituelle.** Notez cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier vous même la dose de JAKAVI® sans avis du médecin prescripteur.



Ne prenez pas JAKAVI® en cas de **grossesse et d'allaitement.** Chez toute femme susceptible de procréer, une méthode de contraception efficace doit être mise en place pendant toute la durée du traitement. En cas de grossesse, la patiente doit être informée des risques potentiels pour le fœtus.



Évitez de manger des **pamplemousses** ou de boire du jus de pamplemousse tout le temps de votre traitement par JAKAVI®.



Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne laissez pas votre traitement à la portée des enfants.



Ne jetez pas les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.
En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), lavez ce linge immédiatement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).



Contactez rapidement votre médecin et appelez les urgences en cas de :

- signes de leucoencéphalopathie multifocale progressive : signes cognitifs, neurologiques ou psychiatriques : troubles visuels, hémiparésie, altération de l'état mental, changement du comportement ;
- signes d'une infection : fièvre, frissons, sueurs...
- saignements.