

HYCAMTIN®

Topotécan

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Deux présentations sont disponibles, sous plaquettes thermoformées :

- boîte de 10 gélules blanches à 0,25 mg.
- boîte de 10 gélules roses à 1 mg.

Conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Conserver les plaquettes thermoformées dans leur emballage d'origine afin de protéger ce médicament de la lumière. Ne pas congeler.

POSOLOGIE

La posologie recommandée est strictement personnelle. L'administration se fait par voie orale, en **une prise par jour, en cure de 5 jours consécutifs avec un intervalle de 3 semaines entre le début de chaque cure**.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin;
Diminution des plaquettes (saignement)	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	En cas de saignements importants, contacter le médecin prescripteur
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Prévenez le médecin dès les premiers symptômes. Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, et une activité physique régulière.	Boire au moins 2 litres d'eau par jour. En cas de constipation prolongée, contactez votre médecin.
Infection de la bouche	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Maintenir une bonne hygiène buccale. (bain de bouche)	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.

Fatigue	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles.	Reposez-vous. Prudence en cas de conduite de véhicules.
Perte d'appétit	Mangez les aliments que vous aimez et essayez de prendre régulièrement des petits repas.	En cas de perte de poids, en parlez avec votre médecin.

Une **perte de cheveux** peut survenir, pour la limiter vous pouvez utiliser une brosse molle et évitez les décolorations, permanentes et colorations, utilisez un shampoing doux. Les cheveux repoussent à l'arrêt de la chimiothérapie.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



Les gélules d'HYCANTIN® **doivent être avalées entières à l'aide d'un verre d'eau**, en **une prise par jour** et ne doivent pas être mâchées, écrasées ou coupées. Elles peuvent être prises **pendant ou en dehors des repas**.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Ne pas laisser à la portée des enfants.



Ne pas jeter les emballages ni les gélules dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre vos gélules d'Hycantin®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ce médicament est à conserver au réfrigérateur entre +2°C et + 8 °C. Ne pas congeler.



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- diarrhées ou vomissements sévères
- signes infectieux (fièvre, toux, frissons, difficultés à respirer, ...)
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang.