INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS, STOPPONS L'ADDICTION !

Les IPP sont une CHANCE....

médicaments **EVALUÉS** et **UTILES** dans des **INDICATIONS PRÉCISES** et **LIMITÉES**

Un IPP **CORRECTEMENT** indiqué et prescrit présente un **BÉNÉFICE /RISQUE** favorable

Esoméprazole Gé INEXIUM®
Lansoprazole Gé LANZOR®; OGAST®
Oméprazole Gé MOPRAL®
Pantoprazole Gé EUPANTOL®; INIPOMP®
Rabéprazole Gé PARIET®

Indications conformes

- ✓ Prévention des récidives d'œsophagite par RGO
- ✓ Traitement du **RGO** avec ou sans **œsophagite**
- ✓ Traitement curatif et d'entretien de l'**Ulcère Gastrique** et **Duodénal**
- ✓ Eradication d'***Helicobacter pylori***
- ✓ Syndrome de **Zollinger-Ellison**
- ✓ Prévention* et Traitement des **lésions** induites par les **AINS** (***AVEC Facteurs de Risque FdR**)

Indications NON conformes

- ✗ **Manifestations extradigestives** du **RGO** (toux chronique, asthme, douleur thoracique non d'origine cardiaque)
- ✗ **Dyspepsie fonctionnelle** en absence de RGO
- ✗ **Epigastralgie**
- ✗ Prévention des **lésions** induites par les **AINS**, l'**aspirine faible dose** et autre antiagrégant **SANS Facteurs de Risque**

FdR : âge > 65 ans ou Antécédents d'Ulcère GD ou Traitement par anticoagulant, antiagrégants ou corticoïdes

...à mauvais escient, une NUISANCE !

À COURT TERME

les effets indésirables sont **LÉGERS** et **PEU FRÉQUENTS**...

... A MOYEN TERME ...

une **DÉPENDANCE** s'installe !

REBOND d'**HYPERACIDITÉ** gastrique à l'**ARRÊT**

RÉGURGITATIONS acides et **BRÛLURES** digestives

... A LONG TERME ...

des **EFFETS INDÉSIRABLES NON NÉGLIGEABLES GRAVES** !

FRACTURES OSSEUSES par malabsorption du calcium

TROUBLES NEUROPSYCHIQUES (insomnies, agitations, confusions dépressions, agressivités, hallucinations), **VERTIGES, GYNÉCOMASTIES, HYPERSUDATIONS, DYSGUEUSIES**

HYPONATRÉMIES, HYPOMAGNÉSÉMIES, Hypokaliémies, Hypocalcémies par malabsorption digestive des électrolytes

ANÉMIES par malabsorption de la vitamine B12

INFECTIONS BACTÉRIENNES DIGESTIVES et **PULMONAIRES**

NÉPHRITES INTERSTITIELLES

30 À 60 % des patients **HOSPITALISÉS** sont sous **IPP**, parmi ces prescriptions, seules **16 À 40 %** sont **CONFORMES** aux indications de l'AMM

Et en Occitanie ?

Audit régional

ANALYSE & AMÉLIORATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES « Prescription des **IPP** »

- **21 établissements** participant à l'étude
- **685** dossiers **patients** analysés

90 % des **prescriptions** sont **NON CONFORMES** aux Référentiels de Bon Usage dont **70 %** se poursuivent au **LONG COURT :**

- **43 %** l'indication est **INCONNUE**
- **33 %** l'indication est **HORS AMM**
- **24 %** de non-conformités **AVEC** une **INDICATION AMM** sont majoritairement liées à une **SURDOSE (46%)** ou à une **DURÉE TROP LONGUE** de traitement **(31%)**